



Forum Suizidprävention 2019: Männer


Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe
Präsidentin IPSILON

Mitorganisaton des Forums Suizidprävention seit Beginn

- 26. 10. 2012: Suizidprävention im Alter
- 21. 10. 2013: Hilfe zum Leben – Hilfe zum Sterben
- 24. 11. 2014: Ein Suizid – viele Betroffene
- 02. 11. 2015: Suizid und Medien
- 31. 10. 2016: Prävention des assistierten Suizids
- 13. 11. 2017: suizid-versuche-verhindern
- 22. 10. 2018: Suizid verstehen
- **04. 11. 2019: Männer**


Gender-Gap fast überall (WHO 2014)

Karte 3. Verhältnis Männer:Frauen bei den altersstandardisierten Suizidraten (2012)



Gender-Gap fast überall (WHO 2014)

Abbildung 5. Verhältnis Männer:Frauen bei den Suizidraten nach Altersgruppe und Einkommensniveau des Landes (2012)








Fig 5 | Age specific mortality rate from suicide by Global Burden of Disease super region and five year age groups for women and men, 2016

Naghavi M et al.: Global, regional and national burden of suicide mortality 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *BMJ* 2019; 364: 194 ff

Abnahme der Suizidraten aktuell



- Central Europe, eastern Europe, and central Asia
- - High income
- - Latin America and Caribbean
- - North Africa and Middle East
- - South Asia
- - South East Asia, east Asia, and Oceania
- - Sub-Saharan Africa

Naghavi M et al.: Global, regional and national burden of suicide mortality 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *BMJ* 2019; 364: 194 ff

Fazit der Autoren:

WHAT IS ALREADY KNOWN ON THIS TOPIC

Suicide is a global public health concern

The World Health Organization reports approximately 800 000 global suicide deaths annually

Men, younger adults, and older adults are reported to have higher rates of suicide than women and middle aged adults

WHAT THIS STUDY ADDS

The global age standardised mortality rate from suicide decreased by almost a third between 1990 and 2016


Men had higher mortality rates from suicide than women, at all ages except for the 15 to 19 age group

Men experienced a lower decrease in age standardised mortality rate from suicide from 1990 to 2016 (23.8%) compared with women (49.0%)


Naghavi M et al.: Global, regional and national burden of suicide mortality 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *BMJ* 2019; 364: 194 ff

Abnehmende Suizidraten in den letzten Jahren

Männer



Frauen




Quelle: BFS – Todesursachenstatistik (CoD)

© BFS 2018

Prof. Dr.med. Gabriela Stoppe
Forum Suizidprävention 2019


Unterschiedliche Methoden

18. Suizidmethoden: Männer (2004–2013)



2004–2013)

Quelle: BFS Todesursachenstatistik, Auswertung: BAG 2015



Quelle: BFS Todesursachenstatistik, Auswertung: BAG 2015

N=300 pro Jahr



Risikofaktoren



Umgang mit Problemen
Sorge für die Gesundheit

Mehr Alkohol
Weniger Depressionen?



Besondere Formen

Erweiterter Suizid

Der Todesplan

Warum ein liebender Familienvater erst seine Frau, dann seine beiden Kinder und schließlich sich selbst umbrachte. Rekonstruktion einer monströsen Tat



Tod von Petra Kelly und Gert Bastian

Zwei Leichen, viele offene Fragen

19. Oktober 1992: In einem Bonner Reihenhaus werden die Leichen von Petra Kelly und Gert Bastian gefunden. Der Tod der beiden Friedens- und Menschenrechtspolitiker erschütterte ihre Partei, Die Grünen. Das Rätsel darüber, warum Bastian zuerst seine Freundin und dann sich erschoss, überlagerte auch eine faire Würdigung von Kellys Leistung.

Von Ulrike Winkelmann



Die Grünen-Politiker Gert Bastian und Petra Kelly anlässlich der Bundesversammlung der Grünen 1985. (imago / Sven Simon)

Wir wünschen gute Diskussionen!

